

Carcharias Prionodon amblyrhynchos, eene nieuwe haaisoort,
gevangen nabij het eiland Solombo.

Tijdens mijne reis naar de Molukken werd aan boord van het stoomschip Ambon in de nabijheid der Solombo-eilanden de hieronder beschrevene haaisoort gevangen, welke ik tot geene der bekende kan terugbrengen. Het voorwerp is een wijfje en woog 24 kilogrammen.

Carcharias (Prionodon) amblyrhynchos Blkr.

Carch. (Prion.) corpore elongato compresso, altitudine $7\frac{7}{8}$ circiter in ejus longitudine; capite 5 circiter in longitudine corporis, duplo circiter latiore quam alto; oculis diametro $3\frac{1}{2}$ circiter in longitudine rostri, pupilla oblonga verticali; rostro acuto parte praeorali rictus longitudine paulo, rictus latitudine multo breviore; linea rostri anteriore subparabolica; naribus rostri apicis multo magis quam angulo oris approximatis, valvula trigona brevi; rictu valde lato multo latiore quam longo; dentibus maxilla superiore triangularibus parum obliquis totis denticulatis basi latis basi externe processu denticulis majoribus serrato; dentibus maxilla inferiore gracilibus rectis denticulatis basi latis; angulo oris sulco parvo labio inferiore quam labio superiore paulo longiore; poris supra angulum oris pluribus valde conspicuis in seriem longitudinalem dispositis; poris postocularibus ansam latam, interocularibus annulum efficiuntibus; spiraculo postico supra pinnam pectoralem sito; squamis minimis quinque- ad septem-carinatis; linea laterali conspicua simplice; pinnis dorsalibus analique eandem formam referentibus, dorsalibus aequae altis ac basi longis valde emarginatis postice acutissimis; dorsali 1^a pectoralibus multo magis quam ventralibus approximata, corpore multo minus duplo humiliore, multo altiore quam basi longa, apice acute rotundata; dorsali 2^a quintuplo circiter ejus longitudinis a dorsali 1^a remota, dorsali 1^a triplo circiter humiliore et breviore, longiore quam alta, anali tota opposita apice rotundata acutiuscula; pectoralibus capite vix longioribus $5\frac{3}{5}$ circiter in longitudine corporis paulo minus duplo longioribus quam latis, emarginatis, acutis; ventralibus oblique quadratis emarginatis pectoralibus plus quadruplo brevioribus;

anali medio basin caudalis inter et ventrales sita, dorsali 2^a multo altiore sed vix latiore, apice acuta; caudali 4 fere in longitudine corporis, lobo posteriore oblique subtruncato acuto lobo anteriore plus triplo breviore, lobo anteriore 5 $\frac{1}{6}$ circiter in longitudine corporis valde emarginato antice acuto longitudine basi minus duplo humiliore; colore corpore superne pinnisque cupreo-coerulescente, inferne albo; iride grisea pupillam versus griseo-argentea; pectoralibus inferne albis apice nigricantibus; ventralibus caudique nigricante marginatis.

Synon. *Ikan Tjutjot* Mal.

Habit. Mare javanicum, prope insulas Solombo.

Longitudo speciminis unici feminini 1540."

Aanm. De soort is na verwant aan *Carcharias (Prionodon) brachyrhynchos* Blkr (*Carcharias (Prionodon) Henlei* Blkr olim nec. Valene.) doch verschilt er van door slanker ligchaam, veel platteren, breederen en tevens betrekkelijk langeren kop, slankere en minder gezaagde onderkaakstanden, doordien de rugvin er aanmerkelijk hooger is dan lang, de 2^{de} rugvin en aarsvin geheel tegen elkander overstaan, door langere borstvinnen (welke bij *Carcharias (Prionodon) brachyrhynchos* 6 $\frac{1}{3}$ maal gaan in de lengte des ligchaams), door de plaatsing der aarsvin in het midden tusschen buikvinnen en staartvin, door kortere staartvin, enz. *Carcharias (Prionodon) brachyrhynchos* heb ik vroeger onder den naam van *Carcharias (Prionodon) Henlei* Blkr beschreven. Ik had toen over het hoofd gezien, dat die naam reeds aan eene andere soort van *Carcharias*, van Caijenne, gegeven was, zoodat hij voor mijne soort niet behouden kan blijven.

Batavia, 12 November 1855.

P. BLEEKER.